# インフルエンザHAワクチン予防接種予診票

| 診察券番号 | 氏名 | 生年月日 | 体温 |
|---|---|---|---|
| ① | | S・H・R　（　歳　か月） | ℃ |
| ② | | S・H・R　（　歳　か月） | ℃ |
| ③ | | S・H・R　（　歳　か月） | ℃ |
| ④ | | S・H・R　（　歳　か月） | ℃ |

| 質問事項 | ① | | ② | | ③ | | ④ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 質問事項がすべていいえの方は〇をしてください。 | | | | | | | | |
| 2. 今日受ける予防接種について説明文を読んで質問はありますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 3. 今日、普段と違って具合の悪いところがありますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 4. 特別な病気(先天性異常、心臓・腎臓・肝臓・脳神経の病気、免疫不全症、血液疾患、その他）にかかったことがありますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 5. 薬や食品(特に鶏卵、鶏肉、その他の鶏由来のもの）で皮膚に発疹や蕁麻疹が出たり、体の具合が悪くなったことがありますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 6. けいれんを起こしたことがありますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 7. 今までに間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患と診断されたことはありますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 8. インフルエンザ予防接種の際に具合が悪くなったことがありますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 9. インフルエンザ以外の予防接種の際に具合が悪くなったことがありますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 10. 近親者に先天性免疫不全症の方がいますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 11. 1ヵ月以内に近親者や周囲で麻しん(はしか）、風しん、水痘(みずぼうそう）おたふくかぜなどにかかった方はいますか。 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 12. その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことや質問があれば、具体的にご記入ください。 | | | | | | | | |
| Lot | | | | | | | | |
| | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |

**医師記入欄**

以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は（　実施できる　・　見合わせた方がよい　）と判断します。

本人又は、保護者に対して、予防接種の効果、副反応及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について説明しました。

医師の署名又は記名押印　　上田　悟史

**本人(保護者)記入欄**

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で接種することに

（　同意します　・　同意しません　）。

署名　　（代筆者の場合：続柄　　）

実施場所：めがね先生の上田こどもクリニック　　医師名：上田　悟史　　接種日時：

# インフエンザHAワクチンの接種について

インフルエンザHAワクチンの接種に当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、表面の予診票のできるだけ詳しくご記入ください。ワクチンを受けられる方が子どもさんの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入ください。

## ワクチンの効果と副反応

インフルエンザHAワクチンの接種により、インフルエンザを予防したり、症状を軽くすることが期待されます。また、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱を持つ、痛くなる、しびれる、小水疱などがみられることがありますが、数日以内に自然に消失します。また、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、咳、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、筋力低下などが起こることがあります。過敏症状として、発疹、蕁麻疹、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管浮腫などが起こることもあります。その他に蜂巣炎、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神、血管迷走神経反応、ブドウ膜炎、振戦が現れることがあります。強い卵アレルギーなどのある方は強い過敏反応を生じる可能性がありますので、接種前に必ず医師に申し出てください。重大な副反応としては、次のような副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎、(4)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(5)けいれん(熱性けいれん含む)、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎(IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎など)、(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿疱症、(12)ネフローゼ症候群など。その他にも不明・不安な症状が現れたり、これらの疾患が疑われるような場合には、接種医又はお近くの医療機関にご相談ください。

## 予防接種を受けることができない人

1. 明らかに発熱のある人(37.5℃以上の人)
2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
3. 過去にインフルエンザHAワクチンの接種を受けて、アナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難、全身性の蕁麻疹などを伴う重症のアレルギー反応)を起こしたことがある人
   なお、他の医薬品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師のその旨を伝えて判断を仰いでください
4. その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

## 予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人

1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
2. 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
3. 過去に予防接種を受けた時に、２日以内に発熱、発疹、蕁麻疹などのアレルギーを疑う異常がみられた人
4. 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
5. 過去にけいれんを起こしたことがある人
6. 過去に免疫不全の診断がなされている人及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
7. 妊娠の可能性がある人
8. 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器疾患のある人

## 予防接種を受けた後の注意

1. インフルエンザHAワクチンの接種を受けたあと30分間は、急な副反応(息苦しさ、蕁麻疹、咳など)が起きることがあります。
   医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
2. 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
3. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこするのはやめましょう。
4. 万一、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。